

下部消化管内視鏡的粘膜切除術、ポリペクトミー(当日入院)を受けられる患者様へ <モビプレップ用>

・入院期間は変更があることもあります

病棟

様

経過	1日目		2日目
日時	入院日		治療翌日/退院日
目標	治療前	治療後	( / )
目標	医師、看護師の説明を受け、治療に安心して臨むことができる	安静を保つことができる 処置が必要な下血を起こさない	合併症なく経過し、不安なく退院できる
検査	治療は午後からです	体温、脈拍、血圧を定期的に測定します	→
治療		カメラ室で点滴をします 点滴は帰室後2-3時間程度で終わります 	
説明・観察	血糖値を下げる薬を内服している方やインスリン注射をしている方は中止します。それ以外の薬は通常通り内服してください  看護師が同意書と外来で処方された薬(ヨーデルS錠3錠)を前日に内服できているか確認します 看護師が、これまでに罹った病気や内服薬などについて伺います。氏名確認のためのリストバンドをつけさせていただきます  時計、指輪、眼鏡、コンタクトレンズは、予めはずしておいてください。義歯は装着したままで構いませんが、その旨を看護師までお知らせください 	治療後はお腹が張っていますが、ガスが出るとお腹の張りは次第に治まってきます。また、治療後の最初の便は出血の有無を確認する為、流さずに看護師を呼んでください。治療後にお腹が痛くなったり、気分が悪くなった場合は看護師を呼んでください	中止している内服薬がある場合は、医師の指示により看護師から説明します  退院決定後、次の外来受診日をお伝えします 入院費用の請求書は、退院日に(週末退院の場合は金曜日に)病棟医療事務が病室までお持ちします。診察券、必要書類等は退院日にお渡しします ご不明な点は、病棟医療事務にご遠慮なくお問い合わせください  追加治療が必要な場合は、医師が説明致します
処置	入院されてから、 ①2ℓのお水で下剤(モビプレップ)を溶かし、1ℓを約1時間かけて飲み、その後500mlのお水を飲みます。便が「無色」または「うす黄色」になれば服用終了です  ②まだ便が「無色」または「うす黄色」にならない場合は、残りのモビプレップをコップ1杯ずつ、便が透明になるまで飲みます。その後に、飲んだモビプレップの半分の水またはお茶を必ず飲んでください  透明の便になりましたら、流さずに看護師を呼んでください		
清潔			
活動	治療室へは歩いて行きます	帰室時 	帰室後 病棟内 
食事			