

下部消化管内視鏡的粘膜切開剥離術、ESD(前日入院)を受けられる患者様へ

病棟

患者氏名

様

経過	1日目	2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	
日時	入院日 (/)	治療日		治療翌日 (/)	治療2日目 (/)	治療3日目 (/)	退院日 (/)	
目標	医師、看護師の説明を受け、治療に安心して臨むことができる		安静を保つことができる 処置が必要な下血を起こさない	処置が必要な下血を起こさない	処置が必要な下血を起こさない			合併症なく経過し、不安なく退院できる
検査		治療は午後からです	体温、脈拍、血圧を定期的に測定します					
治療			治療室で点滴をします 点滴は帰宅後から翌々日10:00まで行います 		朝食後より内服薬は中止薬以外再開です 中止している内服薬がある場合は、医師の指示により看護師から説明します			
説明・観察	看護師が、これまでに罹った病気や内服薬などについて伺います 氏名確認のためのリストバンドをつけさせていただきます 	時計、指輪、眼鏡、コンタクトレンズは、予めはずしておいてください 義歯は装着したままで構いませんが、その旨を看護師までお知らせください	治療後はお腹が張っていますが、ガスが出るとお腹の張りは次第に治まってきます また、治療後の最初の便は出血の有無を確認する為、流さずに看護師を呼んでください 治療後にお腹が痛くなったり、気分が悪くなった場合は看護師を呼んでください				退院決定後、次の外来受診日をお伝えします 入院費用の請求書は、退院日に(週末退院の場合は金曜日に)病棟医療事務が病室までお持ちします 診察券、必要書類等は退院日にお渡しします ご不明な点は、病棟医療事務にご遠慮なくお問い合わせください 追加治療が必要な場合は、医師が説明致します	
処置	20:00ヨーデル3錠(下剤)を飲んでください	①2ℓのお水で下剤(モビプレップ)を溶かし、1ℓを約1時間かけて飲み、その後500mℓのお水を飲みます 便が「無色」または「うす黄色」になれば服用終了です ②まだ便が「無色」または「うす黄色」にならない場合は残りのモビプレップをコップ1杯ずつ、便が透明になるまで飲みます その後に、飲んだモビプレップの半分の水またはお茶を必ず飲んでください 透明の便になりましたら、流さずに看護師を呼んでください						
入浴				看護師が蒸しタオルをお持ちします 				
活動		治療室へは歩いて行きます	帰室時 	帰室後 病棟内 		院内 		
食事	22:00以降 							

※入院期間は変更になることがあります
※詳細につきましては、入院後説明させていただきます。