

# 未破裂動脈瘤にて開頭クリッピング術を受けられる患者様へ

- ・入院期間は変更になることもあります
- ・詳細につきましては、入院された後、看護師より説明させていただきます

患者氏名 \_\_\_\_\_ 様

日時	入院日 ( / / )	( / / )	( / / )	( / / )	( / ~ / / )	( / ~ / / )	退院日 ( / / )	
	手術前日	手術当日・術前	手術当日・術後 (ICU)	手術翌日	術後2日目	術後3～6日目	術後7日目以降	
目標	・医師、看護師の説明を受け、安心して手術に臨むことができる ・手術や麻酔について理解ができる		・治療内容がわかり、安静を守ることができる ・苦痛が軽減される		・安定した歩行ができる ・創部に異常がない		・退院後の生活に不安がない	
検査		手術室入室予定時間 ( : )	手術後、集中治療室 (ICU) に入室します。 頭部CT (術直後) 	頭部CT検査 レントゲン 採血   		(術後5日目) 採血・レントゲン  	(術後7日目) 頭部CT  (術後9日目) 採血 	
治療		 手術	抗生剤・抗痙攣剤・止血剤の点滴を行います 					退院
説明・観察	主治医から、手術の説明があります。同意書に記入・捺印し、看護師にお渡しください 麻酔科医による診察があります  看護師が、これまでにかかった病気、飲んでいる薬などについて伺います。現在内服中のお薬は、お薬の説明書・お薬手帳と共に預けてください 氏名確認のためのリストバンドをつけていただきます 看護師が手術とICUのオリエンテーションをします  〔必要物品〕 <input type="checkbox"/> 和式寝衣 2枚 <input type="checkbox"/> T字帯と下着 (もしくはおむつ2枚) <input type="checkbox"/> バスタオル2枚 <input type="checkbox"/> コップ、歯ブラシ、ストロー <input type="checkbox"/> ティッシュ	当日朝の内服薬は麻酔科より指示が出た薬のみ飲んで頂きます。何を飲むか指示が出たら説明します   時計、指輪、眼鏡、コンタクトレンズは予め、はずしておいてください。義歯は必ず必要はありませんが、看護師までお知らせください	手術後、主治医より手術内容の説明があります				退院後の生活について看護師から説明があります  次回外来受診日をお伝えします 入院費用の詳細は病棟事務にお尋ねください 	
処置	体温、脈拍、血圧を定期的に測定します 手術中着用する弾性ストッキングのサイズを測ります  	手術入室30分前に弾性ストッキングを着用してください	術後は頭に管と尿道にカテーテルが挿入され、心電図モニターが装着されます 	CT検査の結果をみて、頭の管を抜去します	適宜創部の消毒・観察を行います。 トイレまで歩行可能であれば、膀胱留置カテーテルを抜去します。 心電図モニターも外します		(術後7日目) 創部の抜糸を半分します (術後8日目) 残りの抜糸をします 	
入浴	手術後はしばらくシャワーに入れないので、前日にシャワーに入ってください 			タオルで体を拭きます 		(術後4日目) 首下シャワーは可能です 	(術後7日目) 創部を保護すれば、全身のシャワーが可能です。抜糸が終われば、全身のシャワーが可能です 	
活動		手術室へは歩いて行きます 	手術後、ベッドでICUに入室します 翌日、7B病棟に帰室します 状態に応じて、個室や観察室へ帰室します 主治医の指示があるまではベッド上での安静です		頭の管が抜ければ歩行可能です 初回歩行時は看護師が見守ります 			
食事	手術前日の夕食後より絶食となります  開頭手術をすると顔が腫れる事があります。噛みにくさを訴えられる方もいらっしゃいます。ご希望あれば事前に、術後の食事をやわらかい物に変更可能です	術前の飲水は麻酔科の指示があります	絶飲食 	手術翌日昼から食事が開始となります 				