

下部消化管内視鏡的粘膜切除術、ポリペクトミー(当日入院)を受けられる患者様へ <サルプレップ用>

- ・入院期間は変更になることがあります
- ・詳細につきましては、入院された後、看護師より説明させていただきます

病棟 _____ 様

経過	1日目		2日目
日時	治療当日(/)治療前		治療翌日/退院日 (/)
目標	医師、看護師の説明を受け、治療に安心して臨むことができる	安静を保つことができる 処置が必要な下血を起こさない	合併症なく経過し、不安なく退院できる
検査	治療は午後からです。	体温、脈拍、血圧を定期的に測定します。	→
治療		カメラ室で点滴をします。 点滴は帰室後2-3時間程度で終わります。 	 退院
説明・観察	<p>血糖値を下げる薬の内服やインスリン注射は中止します。それ以外の薬は通常通り内服してください。</p> <p><入院時></p> <ul style="list-style-type: none"> ・同意書を持参しているか確認します ・これまでに罹った病気や内服薬などについて伺います ・氏名確認のためのリストバンドをつけさせていただきます ・外来で処方された薬(ヨーデルS錠3錠)を前日に内服できているか確認します <p><治療直前></p> <ul style="list-style-type: none"> ・時計、指輪、眼鏡、コンタクトレンズは、はずしておいてください ・義歯は装着したままで構いませんが、その旨を看護師までお知らせください 	<p>治療後はお腹が張っていますが、ガスが出るとお腹の張りは次第に治まってきます。</p> <p>また、治療後の最初の便は出血の有無を確認するため、流さずに看護師を呼んでください。</p> <p>治療後にお腹が痛くなったり、気分が悪くなった場合は看護師を呼んでください。</p>	<p>中止している内服薬の再開時期については、医師の指示により看護師から説明します。</p> <p>退院決定後、次の外来受診日をお伝えします。</p> <p>入院費用の請求書は、退院日に(週末退院の場合は金曜日に)病棟医療事務が病室までお持ちします。診察券、必要書類等は退院日にお渡しします。ご不明な点は、病棟医療事務にご遠慮なくお問い合わせください。</p> <p>追加治療が必要な場合は、医師が説明致します。</p>
処置	<p>入院後10時頃から下剤を飲み始めます。</p> <p><飲み方></p> <ol style="list-style-type: none"> ①コップ1杯(約120ml)のサルプレップ(下剤)を10分かけて飲んでください ②水又はお茶をコップ2杯(約250ml)飲んでください ③その後は①と②を繰り返して、便が薄黄色または透明になるまで飲み続けてください <p>透明の便になりましたら、流さずに看護師を呼んでください。サルプレップ(下剤)を飲んでいる途中で便が透明になれば、すべて飲み切らなくてかまいません。</p>		
清潔	 入浴不可	 入浴不可	 シャワー
活動	治療室へは歩いて行きます。	<p>帰室時</p>  車椅子移動	<p>帰室後 病棟内</p>  歩行可能
食事	 禁食飲水可		 五分粥