


レジメンと主な副作用の指導内容

☆ 治療スケジュール (CDDP+VP-16)



☆ 治療に使うお薬について

<1日目>

	時間	お薬の名前	お薬の作用
①	2時間	硫酸Mg補正液 8ml	腎障害予防
		ソルテム3A 500ml	
②	2時間	デキサメタゾン 9.9mg	吐き気予防
		生理食塩液 500ml	アレルギー予防
	30分	パロノセトロンバッグ 0.75mg/袋	吐き気予防
③	2時間	エトポシド <i>[100mg/m²]</i> mg	抗腫瘍剤
		生理食塩液 500ml	
④	2時間	シスプラチン <i>[80mg/m²]</i> mg	抗腫瘍剤
		生理食塩液 500ml	
⑤	2時間	ソルテム3A 500ml	腎障害予防
	2時間	マンニトール 300ml	利尿剤

<2日目・3日目>

①	2時間	デキサメタゾン 6.6mg	吐き気予防
		生理食塩液 500ml	アレルギー予防
②	2時間	エトポシド <i>[100mg/m²]</i> mg	抗腫瘍剤
		生理食塩液 500ml	

☆ 副作用について

○自覚症状として現れやすいもの

- 吐き気 (当日～)
- 味覚異常、臭覚過敏 (当日～)
- 口内炎 (1～2週間ごろ)
普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
- 下痢
腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。
- 聴覚障害
高い音が聞きとりにくい、耳鳴りがするなど症状が現れた場合は連絡してください。
- 脱毛 (2週間ごろ～)
投与終了後は再び生えてきます。頭皮を清潔に保ちましょう。

○自覚症状として現れにくいもの (定期的に検査します)

- 腎機能障害
予防のために水分の点滴を行い、尿量を確保します。
無理のない程度の水分摂取を心掛けてください。
- 骨髄抑制 (1～2週間ごろ)
白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することがあります。
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が止まりにくくなります。

☆注意事項

- ※現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。
- ※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。
- ※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。