


## レジメンと主な副作用の指導内容

### ☆治療スケジュール（GEM+S1療法）

下記の治療を3週間ごとに繰り返します



### 内服

お薬の名前	用法用量	投与日	お薬の作用
エスワン ( ) mg錠	1日2回 朝・夕食後 1回 個 【80mg/m <sup>2</sup> 】	/ 夕食後 ~ / 朝食後	抗腫瘍薬

### 点滴

時間	お薬		お薬の作用
30分	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	吐き気予防 アレルギー予防
30分	ゲムシタピン 生理食塩液	【1000mg/m <sup>2</sup> 】 mg 100 mL	抗腫瘍薬

### ☆副作用

- **血管痛（ゲムシタピン点滴中）**  
温めると和らぐことがありますので、症状が現れた場合はすぐにお知らせください。
  - **吐き気（当日～）**
  - **味覚異常・臭覚過敏（当日～）**
  - **発熱、皮疹（当日～）**  
38℃以上の発熱時や、全身に広がる皮疹が出現した場合は受診してください。
  - **口内炎（1～2週間ごろ）**  
普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
  - **下痢**  
腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。
  - **涙道閉塞**  
涙が止まりにくくなる場合があります。
  - **間質性肺炎**  
咳・息切れ・息苦しい・発熱などの症状が現れることがあります。
  - **骨髄抑制（1～2週間ごろ）**  
白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。  
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することがあります。  
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が止まりにくくなります。
- ☆注意事項  
※E171には休薬期間があるので注意して下さい。  
※現れる副作用は個人差があります。  
上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。  
※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。  
※血液検査の結果や副作用の現れ具合によって、延期・減量・休薬・中止になる場合があります。