
レジメンと主な副作用の指導内容

☆ 治療スケジュール (ハイカムチン単剤療法)



☆ 治療に使うお薬について

	時間	お薬の名前	お薬の作用
1	30分	デキサメタゾン 6.6 mg 生理食塩液 100 ml	吐き気予防 アレルギー予防
2	30分	ハイカムチン <i>【1mg/m³】</i> mg 生理食塩液 100 ml	抗腫瘍剤
3	約5分	生理食塩液 50 ml	点滴ルート内の お薬を流し込む

☆ 副作用について

- ○自覚症状として現れやすいもの
- 叶き気 (当日~)
- 味覚異常、臭覚過敏 (当日~)
- 便秘 (当日~)
- 口内炎 (1~2週間ごろ) 普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
- 下痢

腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。

• 脱毛 (2週間ごろ~)

投与終了後は再び生えてきます。 頭皮を清潔に保ちましょう。

- 〇自覚症状として現れにくいもの(定期的に検査します)
- 骨髄抑制 (1~2週間ごろ)

白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。

- →白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を 心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することがあります。
- →赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は 血が止まりにくくなります。

☆ 注意事項

- ※現れる副作用は個人差があります。 上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は 相談してください。
- ※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。
- ※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる 場合があります。