
レジメンと主な副作用の指導内容



☆ 治療に使うお薬について

	時間	お薬の名前		お薬の作用
1	30分	デキサメタゾン 生理食塩液	9 6.6mg 100ml	吐き気予防 アレルギー予防
2	1 時間	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	<i>[60mg/m³]</i> mg 250ml	抗腫瘍剤

☆ 副作用について

〇自覚症状として現れやすいもの

• アレルギー反応 (ドセタキセル点滴中~) さむけ、頭痛、かゆみ、咳、息苦しさ、喉のイガイガなどの症状が現れた場合は すぐにお知らせください。

眠気、ふらつき (点滴中~)

ドセタキセルに含まれるアルコール成分の影響により症状が現れる場合があります。 点滴当日は、運転や危険を伴う行動は避けてください。

- ・吐き気 (当日~)
- 味覚異常、臭覚過敏 (当日~)
- ・筋肉や関節の痛み
- 手足のしびれ (回数を重ねるとおこりやすい)
- **ロ内炎 (1~2週間ごろ)** 普段からうがいなどでロの中をきれいに保ってください。
- 下痢

腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。

• 皮膚や爪の荒れ、色素沈着 保湿や爪のケアを心がけてください。

脱毛 (2週間ごろ~)投与終了後は再び生えてきます。

頭皮を清潔に保ちましょう。

• 間質性肺炎

咳・息切れ・息苦しい・発熱などの症状が現れることがあります。

- ○自覚症状として現れにくいもの(定期的に検査します)
- 骨髄抑制 (1~2週間ごろ)

白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。

- →白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を 心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することがあります。
- →赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は 血が止まりにくくなります。

☆ 注意事項

- ※現れる副作用は個人差があります。 上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は 相談してください。
- ※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。
- ※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。

大阪赤十字病院 薬剤部