

# レジメンと主な副作用の指導内容

## ☆治療スケジュール(アブラキサン療法)

下記の治療を3週間毎に繰り返します

アブラキサン



休薬

休薬

1日目

8日目

15日目

## ☆注射薬

時間	お薬		お薬の作用
30分	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	3 mg/袋 6.6 mg	吐き気予防 アレルギー予防
30分	アブラキサン 生理食塩液	<b>【260mg/m<sup>2</sup>】</b> 100 mg mL	抗腫瘍薬

## ☆注意事項

※現れる副作用は個人差があります。

記載された副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。

※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。

※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・

休薬・中止になる場合があります。

## ☆副作用

・吐き気 (当日～)

・味覚異常、臭覚過敏 (当日～)

・便秘 (当日～)

・筋肉や関節の痛み

・手足のしびれ (回数を重ねるとおこりやすい)

・口内炎 (1～2週間ごろ)

普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。

・下痢

腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。

・皮膚や爪の荒れ、色素沈着

保湿や爪のケアを心がけてください。

・脱毛 (2週間ごろ～)

投与終了後は再び生えてきます。

頭皮を清潔に保ちましょう。

・間質性肺炎

咳・息切れ・息苦しい・発熱などの症状が現れることがあります。

・骨髄抑制 (1～2週間ごろ)

白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。

→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、

手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。

値によっては増やす薬を使用することがあります。

→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が止まりにくくなります。