レジメンと主な副作用の指導内容

☆治療スケジュール(Dose-denseAC)

下記の治療を2週毎に繰り返します

時間	投与するお薬		お薬の作用	日付			
미리티				/	/	/	/
30分	デキサメタゾン パロノセトロンバッグ	9.9 mg 0.75 mg/袋	吐き気予防	0			
2分	ドキソルビシン 生理食塩液	[60mg/m] mg 50 mL	抗腫瘍剤	0			
30分	エンドキサン 生理食塩液	[600mg/m] mg 100 mL	抗腫瘍剤	0			
抗がん剤 投与前	イメンドカプセル 125mg	G.Francisco () 41) (married married (married married (married married)	吐き気予防	•			
朝食後	イメンドカプセル 80mg	(4) Districtions (5) Bit (7) (4) Bit (7) Bit (7) Bit (7) Bit (7) (4) Bit (7) Bit (7) Bit (吐き気予防		•	•	
朝 • 昼食後 1回8錠	デカドロン錠 0.5mg	デカドロン デカドロン (4)	吐き気予防		•	•	•

☆注意事項

- ※現れる副作用は個人差があります。 上記の副作用以外にも気になる症状が現れた 場合は相談してください。
- ※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。
- ※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。

☆副作用

〇自覚症状として現れやすいもの

- ・ 吐き気、食欲不振 (当日~)
- 味覚異常、臭覚過敏 (当日~)
- 便秘 (当日~)
- 不眠

デカドロン服用中は寝つきが悪くなることがあります。

- 尿の着色 (当日~)
- 尿が赤くなることがあります。ロ内炎 (1~2週間ごろ)

普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。

下痢

腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。

• 脱毛 (2週間ごろ~)

投薬終了後は再び生えてきます。頭皮を清潔に保ちましょう。

〇自覚症状として現れにくいもの(定期的に検査します)

• 心機能障害

適宜、心機能検査を行います。

動悸、息苦しさ、咳、むくみなどが現れた場合は、すぐに連絡してください。

骨髄抑制 (1~2週間)

白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。

- →白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・ マスク着用を心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することが あります。
- →赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が 止まりにくくなります。

大阪赤十字病院 薬剤部