

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	5-FU+MMC+RT (MMCなし)【MMC回収期間中】	56	ガルウラシル注(250mg・1000mg):1000m g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day29 Day30 Day31 Day32 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day29 Day30 Day31 Day32
大腸癌	CET(biweekly)+biweeklyCPT-11療法	14	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):500m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1
大腸癌	CET (biweekly)+FOLFIRI療法	14	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):500m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g/m <sup>2</sup> Day1 ガルウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 ガルウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	CET (biweekly)+mFOLFOX6療法	14	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):500m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g/m <sup>2</sup> Day1 ガルウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 ガルウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	CET(biweekly)療法	14	アービタックス注(100mg/20ml):500m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	ET+biweeklyCPT-11療法（2回目以）（2週間区切り）	14	アービタックス注(100mg/20ml):250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1 Day8
大腸癌	CET+biweeklyCPT-11療法（初回）（2週間区切り）	14	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 アービタックス注(100mg/20ml):400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1 Day8 アービタックス注(100mg/20ml):250m g /m <sup>2</sup> Day8
大腸癌	CET+FOLFIRI療法(2回以降)	14	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 アービタックス注(100mg/20ml):250m g /m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day8
大腸癌	CET+FOLFIRI療法(初回)	14	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 アービタックス注(100mg/20ml):400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注(100mg/20ml):250m g /m <sup>2</sup> Day8 生理食塩液 (20ml):20m L Day8

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	CET+mFOLFOX6療法(2回以降)	14	テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 アービタックス注(100mg/20ml):250m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g/m <sup>2</sup> Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day8
大腸癌	CET+mFOLFOX6療法(初回)	14	テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 アービタックス注(100mg/20ml):400m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g/m <sup>2</sup> Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1 アービタックス注(100mg/20ml):250m g/m <sup>2</sup> Day8 生理食塩液 (20ml):20m L Day8
大腸癌	CET療法 (2回目以降1時間)	7	アービタックス注(100mg/20ml):250m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1
大腸癌	CET療法 (2回目以降1時間) +インラフェブ(+ヒニメチン)	7	アービタックス注(100mg/20ml):250m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1
大腸癌	CET療法 (初回2時間)	7	アービタックス注(100mg/20ml):400m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	CET療法（初回2時間）+インコラフィブ（+ビニコチブ）	7	アービタックス注(100mg/20ml):400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (20ml):20m L Day1
大腸癌	CPT-11+BV	14	カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):5m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
大腸癌	CPT-11+Pani療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ベクティビックス点静(100mg/5ml):6m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
大腸癌	CPT-11+S1 (IRIS)	28	カンプト点静(40mg・100mg):125m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):1袋 Day1 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 Day15 デキスト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15
大腸癌	CPT-11+S-1+ベバシズマブ (IRIS+BV)	28	カンプト点静(40mg・100mg):100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):1袋 Day1 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 Day15 デキスト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day15 アバスチン点静(100mg・400mg):5m g /kg Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15
大腸癌	CPT-11単剤療法	42	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 Day15 Day29 デキスト注射液6.6mg(2mL):0.5瓶 Day1 Day15 Day29 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 Day29

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	FOLFIRI + BV療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):5m g /kg Day1
大腸癌	FOLFIRI+Pani療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ベクテイビックス点静(100mg/5ml):6m g /kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	FOLFIRI + RAM療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 サイラムザ点静 (100mg・500mg) :8m g /kg Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
大腸癌	FOLFIRI + アプリベルセプト ベータ	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 ザルトラップ点滴静注(100mg・200mg):4m g /kg Day1



がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	FOLFIRI療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 カンプト点静(40mg・100mg):150m g /m <sup>2</sup> Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
大腸癌	FOLFOXIRI+BV	14	エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 カンプト点静(40mg・100mg):165m g /m <sup>2</sup> Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):3200m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 プロイメンド点静(150m g ):1瓶 Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):5m g /kg Day1
大腸癌	IRIS+Pani	28	カンプト点静(40mg・100mg):100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 Day15 デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 Day15 ベクテイビックス点静(100mg/5ml):6m g /kg Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15
大腸癌	m-FOLFOX6+BV療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g /m <sup>2</sup> Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g /m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 ガルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):5m g /kg Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	mFOLFOX6+Pani療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 ベクティビックス点静(100mg/5ml):6m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	m-FOLFOX6療法	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):85m g/m <sup>2</sup> Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
大腸癌	Pani (単剤) 療法	14	ベクティビックス点静(100mg/5ml):6m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
大腸癌	S-1+BV	14	アバスチン点静(100mg・400mg):5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
大腸癌	sLV5FU2+BV療法	14	アバスチン点静(100mg・400mg):5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	sLV5FU2+BV療法(2回目60分)	14	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1
大腸癌	sLV5FU2療法	14	グラセトロン点静静注液3mgバッグ「明治」:1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アイソボリン点静(25mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):400m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1
大腸癌	SOX (大腸癌)	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1
大腸癌	SOX+BV療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):7.5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1
大腸癌	SOX+CET (2回目以降)	21	デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 アービタックス注(100mg/20ml):250m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day8 Day15



がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	SOX+CET（初回）	21	テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day8 Day15 アービタックス注(100mg/20ml):400m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day8 Day15 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1 アービタックス注(100mg/20ml):250m g/m <sup>2</sup> Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day8 Day15
大腸癌	UFT/LV+BV	28	アバスチン点静(100mg・400mg):5m g/kg Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15
大腸癌	XELIRI+BV	21	カンプト点静(40mg・100mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):7.5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
大腸癌	Xeloda+BV療法	21	アバスチン点静(100mg・400mg):7.5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
大腸癌	Xelox + BV療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):7.5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1
大腸癌	Xelox + BV療法(2回目60分)	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 テキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 アバスチン点静(100mg・400mg):7.5m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
大腸癌	Xelox + Pani	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ベクティビックス点静(100mg/5ml):6m g/kg Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1
大腸癌	Xelox療法	21	アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1 デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 エルプラット点静 (100mg/20ml):130m g/m <sup>2</sup> Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1