

| がん種 | レジメン名                       | インターバル | 薬剤情報   |
|-----|-----------------------------|--------|--|
|     |                             |        | 薬品名：数量 投与日   |
| 食道癌 | DCF（食道癌）                    | 21     | マンニトール注 20%(300ml):300m L Day1<br>ソルアセトF輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3<br>プロイメンド点静(150mg):1瓶 Day1<br>生理食塩液(100ml):100m L Day1<br>デキスト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1<br>アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1<br>ドセタキセル点静(20mg・80mg):70mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1<br>シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):70mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>フルオウラシル注(250mg・1000mg):750mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3<br>デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3<br>生理食塩液 (50ml):50m L Day6 |
| 食道癌 | m-FOLFOX6療法（食道癌）            | 14     | アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1<br>デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1<br>アイソボリン点静(25mg・100mg):200mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1<br>エルプラット点静 (100mg/20ml):85mg/m <sup>2</sup> Day1<br>フルオウラシル注(250mg・1000mg):400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day1<br>フルオウラシル注(250mg・1000mg):2400mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液(100ml):100m L Day1  |
| 食道癌 | wPTX（食道癌）                   | 49     | デキスト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ガスター注(20mg/2ml):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>グアラセトロン点静注射液3mg/バッグ「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>パクリタセル点滴静注射液「ホスピール」(30mg・100mg):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36<br>ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36  |
| 食道癌 | ニボルマブ療法【480mg・4週間隔】（胃癌・食道癌） | 28     | 生理食塩液 (50ml):50m L Day1<br>オプジーボ点静(240mg/24ml):480mg Day1<br>生理食塩液(100ml):100m L Day1  |
| 食道癌 | ニボルマブ療法240mgV（胃癌・食道癌）       | 14     | 生理食塩液 (50ml):50m L Day1<br>オプジーボ点静(240mg/24ml):240mg Day1<br>生理食塩液(100ml):100m L Day1  |

| がん種 | レジメン名         | インターバル | 薬剤情報  |
|-----|---------------|--------|---|
|     |               |        | 薬品名：数量 投与日  |
| 食道癌 | 新High FP+RT療法 | 28     | 生理食塩液(1000ml):1000m L Day1<br>K C L 注(20mEq/20ml)キト「ルE」:1キト Day1<br>硫酸M g 補正液(20mEq/20ml):1 A Day1<br>プロイメンド点静(150m g ):1瓶 Day1<br>生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3<br>アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1<br>デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1<br>シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):70m g /m <sup>2</sup> Day1<br>生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4<br>マンニトール注 2 0 %(300ml):300m L Day1<br>ガルオケラニル注(250mg・1000mg):700m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4<br>生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1<br>デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3<br>生理食塩液 (50ml):50m L Day5           |
| 食道癌 | 新High FP療法    | 28     | ガルオケラニル注(250mg・1000mg):800m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>プロイメンド点静(150m g ):1瓶 Day1<br>生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3<br>アロキシ点静バッグ(0.75mg/50ml) :1袋 Day1<br>デキサト注射液6.6mg(2mL):1.5瓶 Day1<br>シスプラチン点静【マルコ】(10mg/20ml):80m g /m <sup>2</sup> Day1<br>マンニトール注 2 0 %(300ml):300m L Day1<br>生食注シリンジ(10ml):1筒 Day1<br>生理食塩液(1000ml):1000m L Day1<br>K C L 注(20mEq/20ml)キト「ルE」:1キト Day1<br>硫酸M g 補正液(20mEq/20ml):1 A Day1<br>デキサト注射液6.6mg(2mL):1瓶 Day2 Day3<br>生理食塩液 (50ml):50m L Day6 |