

# レジメンと主な副作用の指導内容

## ☆治療スケジュール (oneDC)

下記の治療を 4 週間ごとに繰り返します。



## ☆治療に使うお薬について

お薬の名前		投与時間	お薬の作用
グラニセトロン	3mg/袋	30分間	吐き気予防 アレルギー予防
デキサメタゾン	6.6mg		
<b>ドセタキセル</b>	<b>[60mg/m<sup>2</sup>] mg</b>	1時間	抗腫瘍剤
5%ブドウ糖液	250mL		
<b>カルボプラチン</b>	<b>[AUC5] mg</b>	1時間	抗腫瘍剤
5%ブドウ糖液	250mL		

## ☆注意事項

※現れる副作用は個人差があります。

上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。

※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合は  
すぐにお知らせください。

※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期、減量、休薬、中止  
になる場合があります。

## ☆副作用について

○自覚症状として現れるもの

- **アレルギー反応 (ドセタキセル、カルボプラチン点滴中～)**  
→さむけ、頭痛、かゆみ、咳、息苦しさ、喉のイガイガなどの症状が現れた場合は、  
すぐにお知らせください。
  - **眠気、ふらつき (点滴中～)**  
→ドセタキセルに含まれるアルコール成分の影響により症状が現れる場合があります。  
点滴当日は、運転や危険を伴う行動は避けてください。
  - **吐き気 (当日～)**
  - **味覚異常、臭覚過敏 (当日～)**
  - **便秘 (当日～)**
  - **筋肉や関節の痛み**
  - **手足のしびれ (回数を重ねるとおこりやすい)**
  - **むくみ**  
→足のむくみや急な体重増加が現れた場合はお知らせください。
  - **口内炎 (1～2週間ごろ)**  
→普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
  - **下痢**  
→腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。
  - **皮膚や爪の荒れ、色素沈着**  
→保湿や爪のケアを心がけてください。
  - **脱毛 (2週間ごろ～)**  
→投与終了後は再び生えてきます。頭皮を清潔に保ちましょう。
  - **間質性肺炎**  
→咳・息切れ・息苦しい・発熱などの症状が現れることがあります。
- 自覚症状として現れにくいもの (定期的に検査します)
- **骨髄抑制 (1～2週間ごろ)**  
白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。  
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用  
を心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することがあります。  
→赤血球減少時は貧血症症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が止まりにくくなります。