

## レジメンと主な副作用の指導内容

### ☆治療スケジュール(weekly NDP療法)

下記の治療を1週毎に繰り返します

時間	お薬			お薬の作用
30分	グラニセロンバック デキサメタゾン	3 6.6	mg/袋 mg	吐き気予防 アレルギー予防
90分	アクプラ 生理食塩液	【30mg/m <sup>2</sup> 】 500	mg mL	抗腫瘍薬
90分	ソルアセトF	500	mL	水分補給
90分	ソルアセトF	500	mL	水分補給

### ☆副作用

- ・吐き気（当日～）
- ・味覚異常、臭覚過敏（当日～）
- ・便秘(当日～)
- ・口内炎（1～2週間ごろ）  
普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
- ・下痢  
腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。
- ・腎機能障害  
腎臓を守るために輸液を点滴し、十分な尿量を確保します。排尿は我慢しないでください。
- ・聴覚障害  
耳鳴り・耳が聞こえにくいなどの症状が現れた場合はお知らせください。
- ・骨髄抑制（1～2週間ごろ）  
白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。  
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することがあります。  
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が止まりにくくなります。

### ☆注意事項

- ※現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。
- ※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。
- ※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。