


レジメンと主な副作用の指導内容

☆治療スケジュール (weeklv CDDP+RT)

放射線治療中、1週間に1回 (毎週 曜日) に投与します。



☆点滴スケジュール

投与時間	お薬の名前		お薬の作用
2時間	ソルデム3A 硫酸マグネシウム	500mL 20mEq/A	腎機能予防
2時間	生理食塩水	500mL	腎機能予防
30分間	プロイメンド 生理食塩水	150mg 100mL	吐き気止め
30分間	アロキシ デキサート	0.75mg/袋 6.6mg	吐き気止め
2時間	シスプラチン (生理食塩液)	[40mg/ml] mg 500mL	抗腫瘍剤
2時間	ソルデム3A	500mL	腎機能予防
2時間	生理食塩水	500mL	腎機能予防

☆注意事項

※現れる副作用は個人差があります。

右記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。

※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。

※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。

☆副作用について

- ・吐き気 (当日～)
- ・味覚異常、臭覚過敏 (当日～)
- ・便秘 (当日～)
- ・口内炎 (1～2週間ごろ)
→普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
- ・下痢
→腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。
- ・聴覚障害
→高い音が聞きとりにくい、耳鳴りがするなど症状が現れた場合は連絡してください。
- ・腎機能障害
→予防のために水分の点滴を行い、尿量を確保します。
無理のない程度の水分摂取を心掛けてください。
- ・骨髄抑制 (1～2週間ごろ)
白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、
手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。
値によっては増やす薬を使用することがあります。
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、
血小板減少時は血が止まりにくくなります。