

レジメンと主な副作用の指導内容

次クールへ



☆治療スケジュール（C-mab単剤療法（2回目以降））

下記の治療を毎週行います。

				1日目	...	8日目
薬品名		効能	用法	/	...	/
レスタミン	5 錠	アービタックスのアレルギー予防	内服	○		
デキサメタゾン	6.6 mg	副腎皮質ステロイド剤	30分	○		
アービタックス	【250mg/m ² 】 mg	抗がん剤	1時間	○		

☆副作用について

• **注射時反応（アービタックス点滴中～）**

点滴開始後に発熱、さむけ、発疹などの症状が現れることがあります。

また、吐き気や頭痛、倦怠感などが起こる場合もあります。

特に初回に多いと言われています。

症状が現れた場合はすぐにお知らせください。

• **眠気、ふらつき（レスタミン）**

レスタミンの影響により症状が現れる場合があります。

点滴当日は運転や危険を伴う行動は避けてください。

• **間質性肺炎**

咳・息切れ・息苦しい・発熱などの症状が現れることがあります。

• **皮膚症状**

発疹、皮膚の乾燥、ひび割れが起こることがあります。

皮膚を清潔に保ち、保湿を心がけ、刺激を与えないようにしてください。

• **検査値異常**

電解質異常（マグネシウム、カルシウムなどの減少）が現れることがあります。

☆現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。

☆抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。

☆特に点滴のある日は、無理のない程度に水分の摂取を心掛けてください。

☆血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。