

レジメンと主な副作用の指導内容

☆治療スケジュール (ABVD)

下記の治療を 4 週間毎に繰り返します。(2週間に1回点滴を行います。)

時間	薬品名	用量	/	/	/
30分	グラニセトロン バッグ (吐き気予防) ソルメドロール (プレオの副作用予防)	3 mg/袋 125 mg	○	…	○
2分	エクザール	<i>[6mg/m²]</i> mg	○	…	○
30分	アドリアシン (赤)	<i>[25mg/m²]</i> mg	○	…	○
30分	プレオ	<i>[10mg/m²]</i> mg	○	…	○
2時間	ダカルバジン	<i>[375mg/m²]</i> mg	○	…	○

☆副作用について

- **腫瘍崩壊症候群 (点滴当日～)**
急激な細胞の崩壊により腎障害などをきたすことがあります。
- **血管痛 (ダカルバジン点滴中)**
血管が痛くなることがあります。
予防のために遮光したり、点滴速度を落としたりします。
- **吐き気 (当日～)**
- **味覚異常、臭覚過敏 (当日～)**
- **便秘 (当日～)**
- **手足のしびれ (回数を重ねるとおこりやすい)**
- **口内炎 (1～2週間ごろ)**
普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
- **下痢**
腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合はお知らせください。
- **心機能障害**
適宜、心機能検査を行います。
動悸、息苦しさ、咳、むくみなどが現れた場合は、すぐに連絡してください。
- **間質性肺炎**
咳、息切れ、息苦しい、発熱などの症状が現れることがあります。
- **脱毛 (2週間ごろ～)**
投与終了後は再び生えてきます。頭皮を清潔に保ちましょう。
- **骨髄抑制 (3～4週間ごろ)**
白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。値によっては増やす薬を使用することがあります。
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が止まりにくくなります。

☆注意事項

※現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。

※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。

※特に点滴のある日は、無理のない程度に水分の摂取を心掛けてください。

※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。