

レジメンと主な副作用の指導内容

☆治療スケジュール (LSG15 (AMP) 療法)

/ 点滴投与

時間	薬品名	用量
30分	グラニセトロン (吐き気予防) プレドニン	3 mg/袋 【40mg/m ² 】 mg
30分	アドリアシン	【30mg/m ² 】 mg
30分	サイメリン	【60mg/m ² 】 mg

☆注意事項

※現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも
気になる症状が現れた場合は相談してください。

※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした
場合はすぐにお知らせください。

※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・
減量・休薬・中止になる場合があります。

☆副作用について

- 腫瘍崩壊症候群 (点滴当日～)
急激な細胞の崩壊により腎障害などをきたすことがあります。
- 吐き気 (当日～)
- 味覚異常、臭覚過敏 (当日～)
- 便秘
- 不眠
- 尿の着色 (点滴当日～)
アドリアシンにより尿が赤くなる場合があります。
- 口内炎 (1～2週間ごろ)
普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。
- 下痢
腹痛や1日4回以上の下痢、水様便、夜中に下痢が継続する場合は
お知らせください。
- 脱毛 (2週間ごろ～)
投与終了後は再び生えてきます。
頭皮を清潔に保ちましょう。
- 心機能障害
適宜、心機能検査を行います。
動悸、息苦しさ、咳、むくみなどが現れた場合はすぐに連絡してください。
- 骨髄抑制 (1～2週間ごろ)
白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・
マスク着用を心掛けてください。
値によっては増やす薬を使用することがあります。
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が