

レジメンと主な副作用の指導内容

☆治療スケジュール（ポテリジオ）

/ 点滴投与

時間	薬品名	用量
2時間	ポテリジオ	$[1\text{mg}/\text{kg}]$ mg

☆内服薬

お薬の名前	お薬の作用
ロキソプロフェン 	解熱鎮痛剤
エピナスチン 	抗アレルギー薬

☆注意事項

☆現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。

☆抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。

☆特に点滴のある日は、無理のない程度に水分の摂取を心掛けてください。

☆血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。

☆副作用について

• 腫瘍崩壊症候群（当日～）

急激な細胞の崩壊により腎障害などをきたすことがあります。

• 注射時反応（ポテリジオ点滴中～）

点滴開始後に発熱、さむけ、発疹などの症状が現れることがあります
また、吐き気や頭痛、倦怠感などが起こる場合もあります。
特に初回に多いと言われています。
症状が現れた場合はすぐにお知らせください。

• 皮膚症状

発疹、皮膚の炎症、痒みが起こることがあります。

• 感染症

• 骨髄抑制（1～2週間ごろ）

白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。
値によっては増やす薬を使用することがあります。
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、
血小板減少時は血が止まりにくくなります。