

レジメンと主な副作用の指導内容


☆治療スケジュール（ガザイバ）

/ 投与

〈ガザイバ開始30～60分前に内服〉

お薬の名前	お薬の作用
ロキソプロフェン 	解熱鎮痛剤
エピナスチン 	抗アレルギー剤

時間	投与するお薬
30分	デキサメタゾン 19.8mg
1時間	生食



ガザイバ 1000 mg

※ガザイバ

注射時反応を予防するために、点滴はゆっくり投与し始めます。
特に症状がなければ、30分ごとに点滴速度を上げていきます。

点滴時間… 初回：約4時間15分 2回目～：約1時間30分

☆副作用について

- 腫瘍崩壊症候群（当日～）
急激な細胞の崩壊により腎障害などをきたすことがあります。
- 注射時反応
投与開始時や点滴速度を上げた際に、発熱、悪寒、頭痛、咳、喉の違和感、発疹、虚脱感などが発現することがあります。
多くの場合、点滴速度を落すことで軽快します。
予防のために、デキサメタゾンの投与、点滴開始30～60分前にロキソプロフェンとエピナスチンの内服を行います。
- 易感染性
手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。

- ☆現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。
- ☆抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。
- ☆特に点滴のある日は、無理のない程度に水分の摂取を心掛けてください。
- ☆血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。