

レジメンと主な副作用の指導内容

☆治療スケジュール（Aza療法 皮下注） コース目

下記の治療を4週間毎に繰り返します。

時間	薬品名	用量	/	/	/	/	/	/	/
内服	カイトリル (吐き気予防)	1 mg	○	○	○	○	○	○	○
皮下注	アザシチジン	$[75\text{mg}/\text{m}^2]$ mg	○	○	○	○	○	○	○

☆副作用について

• 注射部位反応

注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。

• 吐き気（当日～）

• 味覚異常、臭覚過敏（当日～）

• 便秘（当日～）

• 発熱、皮疹（当日～）

38℃以上の発熱時や、
全身に広がる皮疹が出現した場合には受診してください。

• 口内炎（1～2週間ごろ）

普段からうがいなどで口の中をきれいに保ってください。

• 心機能障害

適宜、心機能検査を行います。
動悸、息苦しさ、咳、むくみなどが現れた場合はすぐに連絡してください。

• 骨髄抑制（1～2週間ごろ）

白血球、赤血球、血小板など血液成分が減ることがあります。
→白血球減少時は感染症にかかりやすくなりますので、手洗い・うがい・マスク着用を心掛けてください。
値によっては増やす薬を使用することがあります。
→赤血球減少時は貧血症状が起こりやすくなり、血小板減少時は血が止まりにくくなります。

☆注意事項

※現れる副作用は個人差があります。上記の副作用以外にも気になる症状が現れた場合は相談してください。

※抗がん剤投与中に点滴・注射部位が痛んだりはれたりした場合はすぐにお知らせください。

※血液検査の結果や副作用の現れ具合によってお薬が延期・減量・休薬・中止になる場合があります。