

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
白血病	ACR/AraC療法	5	アクラシノン注(20mg):20m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点静注液3mg/バツク「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml):50m L Day5
白血病	AIDA療法	8	ソルデム1 輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 イダマイシン静注(5mg):12m g /m <sup>2</sup> Day2 Day4 Day6 Day8 注射用水 (20ml):2A Day2 Day4 Day6 Day8 生理食塩液(100ml):100m L Day2 Day4 Day6 Day8 グラセトロン点静注液3mg/バツク「明治」:1袋 Day2 Day4 Day6 Day8
白血病	ATO療法	1	トリセノックス注(10mg/10mL):0.15m g /kg Day1 ブドウ糖注(5%250ml):250m L Day1 グラセトロン点静注液3mg/バツク「明治」:1袋 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
白血病	Aza療法(点滴)	7	ビダーザ注(100mg):75m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水 (20ml):10m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 グラセトロン点静注液3mg/バツク「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
白血病	Aza療法(皮下注射)	7	ビダーザ注(100mg):75m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水 (20ml):4m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 グラセトロン点静注液3mg/バツク「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
白血病	CAG療法	14	グラセトロン点静注液3mg/バツク「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):10m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 アクラシノン注(20mg):14m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4
白血病	DNR/AraC療法 (Consolidation)	5	グラセトロン点静注液3mg/バツク「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダウノマイシン静注(20mg):50m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50ml):50m L Day5

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
白血病	DNR+AraC療法 (Induction)	7	ダウノマイシン静注(20mg):50m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):50m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (50ml):50m L Day7
白血病	FAM療法	5	ソルデム1 輸液(500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルダラ静注(50mg):25m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ノバントロン注(20mg/10ml):8m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 シタラビン点静(400m g・1g):2000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プレドニン水溶性注(20mg):1m g /kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
白血病	GO	28	マイロターグ点静(5mg):9m g /m <sup>2</sup> Day1 Day15 注射用水 (20ml):1A Day1 Day15 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day15
白血病	HDAC療法	5	シタラビン点静(400m g・1g):2000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1 輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
白血病	Hyper-CVAD/MA療法Acourse	14	ソルデム1 輸液(500ml):1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 グラセトロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 デキサト注射液6.6mg(2mL):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 Day12 Day13 Day14 エンドキサン注(100mg・500mg):300m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注(400mg/4ml):720m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 アドリアシン注(10mg):50m g /m <sup>2</sup> Day4 生理食塩液(100ml):100m L Day4 Day12 Day13 Day14 オンコピン注(1mg):2m g Day4 Day11 生理食塩液 (50ml):50m L Day4 Day11

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
白血病	Hyper-CVAD/MA療法Bcourse	4	ソルデム3A輸液(500ml):500m L Day1 メイロン静注 7%(20ml):2 A Day1 ソルデム3A輸液(500ml):2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 メイロン静注 7%(20ml):8A Day1 Day2 Day3 Day4 グラセトロン点静注液3mg/100ml「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):800m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day3 Day4 メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):200m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液(100ml):100m L Day1 シタラビン点静(400m g・1g):3000m g/m <sup>2</sup> Day3 Day4 ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付):1瓶 Day3 Day4 ロイコボリン注(3mg/1ml):5 A Day3 Day4
白血病	IDA+AraC療法	7	イダマイシン静注(5mg):12m g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 注射用水 (20ml):1 A Day1 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):50m g/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 グラセトロン点静注液3mg/100ml「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 (50ml):50m L Day7
白血病	I O(cycle1)	21	ベスポンサ点滴静注用1mg:0.8m g/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 注射用水 (20ml):4m L Day1 Day8 Day15 ベスポンサ点滴静注用1mg:0.5m g/m <sup>2</sup> Day8 Day15
白血病	JALSG202-U Maintenance1.3	29	メソトレキセート点静(5mg・50mg・200mg):150m g/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day29 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day15 Day29 グラセトロン点静注液3mg/100ml「明治」:1袋 Day1 Day15 Day29
白血病	JALSG202-U Maintenance2	15	オンコピン注(1mg):1.5m g/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15 ロイナーゼ注(5000KU):10000 K U/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 注射用水(5ml)「フソー」:2m L Day1 Day8 Day15 グラセトロン点静注液3mg/100ml「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15 エンドキサン注(100mg・500mg):600m g/m <sup>2</sup> Day8 生理食塩液(250ml):250m L Day8

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
白血病	JALSG202-U Maintenance4	15	<p>オンコピン注(1mg):1.5m g /m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 Day15  グレーストロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day8 Day15  ロイナーゼ注(5000KU):10000 K U/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  注射用水(5ml)「フソー」:2m L Day1 Day8 Day15  テラルピシン注(10mg):25m g /m<sup>2</sup> Day8  ブドウ糖注(5%100ml):100m L Day8</p>
白血病	LDAC療法	14	<p>キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):10m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9</p>
白血病	LPA2005 Consoli1 High Risk	4	<p>生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4  グレーストロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4  シタラビン点静(400m g ・1g):1000m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4  イダマイシン静注(5mg):5m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  注射用水 (20ml):1A Day1 Day2 Day3 Day4  生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4</p>
白血病	LPA2005 Consoli2 High Risk	5	<p>生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  ノバントロン注(20mg/10ml):10m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5  グレーストロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
白血病	LPA2005 Consoli3 High Risk	4	<p>キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):50m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4  生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4  グレーストロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4  イダマイシン静注(5mg):12m g /m<sup>2</sup> Day1  注射用水 (20ml):2A Day1  生理食塩液(100ml):100m L Day1  生理食塩液 (50ml):50m L Day4</p>
白血病	LPA2005 Consoli3 Int. Risk	2	<p>イダマイシン静注(5mg):12m g /m<sup>2</sup> Day1 Day2  注射用水 (20ml):2A Day1 Day2  生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2  グレーストロン点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2  生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2</p>

がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
白血病	MEC療法	6	エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:80m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ノバントロン注(20mg/10ml):6m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シタラビン点静(400m g・1g):1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 グラセロンの点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 プレドニン水溶性注(20mg):1m g /kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
白血病	MEC療法(変法)	5	生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シタラビン点静(400m g・1g):1000m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ノバントロン注(20mg/10ml):8m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点静(100mg/5ml)「サト」:100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注(5%500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセロンの点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 プレドニン水溶性注(20mg):1m g /kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
白血病	MIT/AraC療法	5	グラセロンの点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注(20mg・200mg・1000mg):100m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ノバントロン注(20mg/10ml):7m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 生理食塩液(100ml):100m L Day1 Day2 Day3 生理食塩液 (50ml):50m L Day5
白血病	R (リツキサン) -B療法(2回目以降)【疾患限定】	2	リツキサン点滴静注(100mg・500mg):375m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 トレアキシ点静(100mg):90m g /m <sup>2</sup> Day1 Day2 注射用水 (20ml):4 A Day1 Day2 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day2 グラセロンの点静注液3mg/kg「明治」:1袋 Day1 Day2 デキサト注射液6.6mg(2mL):0.5瓶 Day1 Day2 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day2



がん種	レジメン名	インターバル	薬剤情報
			薬品名：数量 投与日
白血病	ビーリンサイト (cycle1) (BW≥45kg用)	42	テグサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 Day8 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 Day8 ビーリンサイト点滴静注用35μg:9μ g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生理食塩液 (20ml):20m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 注射用水(5ml)「フソー」:3m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 ビーリンサイト点滴静注用35μg:28μ g Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28
白血病	ビーリンサイト (cycle2-5) (BW≥45kg用)	42	テグサト注射液6.6mg(2mL):2.5瓶 Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1 ビーリンサイト点滴静注用35μg:28μ g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生理食塩液(250ml):250m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生理食塩液 (20ml):20m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 注射用水(5ml)「フソー」:3m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28
白血病	リツキサンの療法(2回目以降)【疾患限定】	1	リツキサン点滴静注(100mg・500mg):375m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 生理食塩液 (50ml):50m L Day1
白血病	リツキサンの療法(初回)【疾患限定】	1	リツキサン点滴静注(100mg・500mg):375m g /m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液 (500ml):500m L Day1 ソルデム3A輸液(500ml):1000m L Day1 メイロン静注7%(20ml):4A Day1