医薬品情報管理室からのお知らせ

ご利用にあたっての注意

記載されている内容が、正確な情報であるよう努めています。しかし、医療の進歩などにより、記載された内容が正確かつ完全ではなくなる場合もございます。
その点を十分考慮されたうえでご利用ください。

・・・・・目次・・・・・

1. 周術期に休薬を考慮する必要のある抗凝固薬・抗血小板薬
2. 消化器内視鏡検査・治療における内服抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間の目安
3. 術前・術後・産後・長期間安静状態時に休薬考慮する必要のあるホルモン製剤

周術期に休薬を考慮する必要のある抗凝固薬・抗血小板薬

下記期間はあくまでも目安です。下記薬剤の服用目的、血栓リスク・出血のリスクの高さ、各種ガイドライン等に基づき、休薬の有無、及び休薬期間を決定してください。

（注）消化器内視鏡検査時の休薬目安は、別紙「消化器内視鏡検査・治療における内服抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間の目安」を参照してください。

有効成分	院内採用薬	院外登録薬	その他 ジェネリック医薬品等	休薬が必要な場合の検査・術前休薬考慮期間	
				添付文書・IF メーカー推奨	主要ガイドライン
リバーロキサバン	 イグザレルトOD錠10mg イグザレルトOD錠15mg		イグザレルト錠10mg イグザレルト錠15mg イグザレルト錠2.5mg イグザレルト細粒分包 イグザレルトDS小児用	24時間前	（注）休薬期間は出血リスク、腎機能に応じて選択 1日前（※1） 2日前（※2） 24～48時間前（※3） 12～48時間前（※4，6） 48時間前（※5）
アピキサバン	 エリキュース錠2.5mg エリキュース錠5mg			24～48時間前	（注）休薬期間は出血リスク、腎機能に応じて選択 1～2日前（※1） 3日前（※2） 24～48時間前（※3） 12～48時間前（※4，6） 48時間前（※5）
ダビガトラン エテキシラート メタンスルホン酸塩	 プラザキサカプセル75mg プラザキサカプセル110mg			24時間前 ※ ただし下記の①および②の場合は48時間以上前 ① 完全な止血機能を要する大手術を実施する場合 ② 出血の危険性が高い患者を対象とする場合	（注）休薬期間は出血リスク、腎機能に応じて選択 1～4日前（※1，3） 4～5日前（※2） 12～96時間前（※4，6） 48～96時間前（※5） 2日～5日前（※8）
エドキサバン トシル酸塩	 リクシアナOD錠30mg	 リクシアナOD錠60mg リクシアナOD錠15mg	リクシアナ錠15/30/60mg	24時間前	（注）休薬期間は出血リスク、腎機能に応じて選択 1日前（※1） 2日前（※2） 24～48時間前（※3） 12～48時間前（※4，6） 48時間前（※5）
ワルファリン カリウム	 ワーファリン錠1mg ワーファリン錠0.5mg		ワルファリンK錠/細粒 ワーファリン錠5mg ワーファリン顆粒	5日前	5日前（※1，2，8） 3～5日前（※3，4，6）
プラスグレル塩酸塩	 エフィエント錠3.75mg エフィエントOD錠20mg	 エフィエント錠2.5mg	エフィエント錠5mg	14日前	14日前（※1） 5～10日前（※2） 7日前（※4，6） 5日前（※8）
クロピドグレル 硫酸塩	 クロピドグレル錠75mg「トーワ」	 プラビックス錠25mg プラビックス錠75mg	クロピドグレル錠25/50mg	14日前	14日前（※1，3） 5～10日前（※2） 5日前（※4，6）
チクロピジン塩酸塩		 パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠/細粒 パナルジン細粒	7～14日前	10～14日前（※1，3） 5～10日前（※2） 7日前（※8）
チカグレロル			ブリリンタ錠	5日前	5日前（※1） 3日前（※4，6）
クロピドグレル硫酸塩 /アスピリン	 コンプラビン配合錠		ロレアス配合錠	14日前	14日前（※1） クロピドグレル・アスピリンの各休薬期間参照

有　効　成　分	院内採用薬	院外登録薬	その他 ジェネリック医薬品等	休薬が必要な場合の 検査・術前休薬考慮期間	
				添付文書・IF メーカー推奨	主要ガイドライン
アスピリン	 バイアスピリン錠100mg		アスピリン アスファネート配合錠A81 ニトギス配合錠A81 バッサミン配合錠A81 バファリン配合錠A81 ファモター配合錠A81 等	7日前	3～7日（※3） 5～7日前（※2） 7～10日前（※1） 7日前（※4） 5日前（※8）
アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	 キャブピリン配合錠	緊急PCI時限定採用			
アスピリン /ランソプラゾール		 タケルダ配合錠			
シロスタゾール	 シロスタゾールOD錠50mg 「ケミファ」	 プレタールOD錠50mg プレタールOD錠100mg	シロスタゾール錠/OD錠/ゼリー プレタール錠/散20%	2～3日前	3日前（※1） 2日前（※2）
サルポグレラート塩酸塩	 アンプラーグ錠100mg		アンプラーグ錠50mg アンプラーグ細粒10% サルポグレラート塩酸塩錠　等	24時間前	1～2日前（※1） 1日前（※2）
ジラゼプ塩酸塩		 コメリアンコーワ錠100	コメリアンコーワ錠50 ジラゼプ塩酸塩錠　等	2～3日前	半減期（時間） 20μg錠：約1.1 LA60μg錠：約14.7
ベラプロスト ナトリウム	 プロサイリン錠20	 ベラサスLA錠60μg	ケアロードLA錠60μg ドルナー錠20μg ベラプロストナトリウム錠	24～48時間前	20μg：1～2日（※1） LA60μg：2～3日（※1） 1日前（※2）
ジピリダモール	 ペルサンチン錠25mg		ジピリダモール錠 ジピリダモール散12.5% ペルサンチン錠12.5mg ペルサンチン錠100mg　等	24時間前	1～2日前（※1） 2日前（※2）
リマプロスト アルファデクス	 リマプロストアルファデクス錠5μg 「サワイ」	 オパルモン錠5μg	プロレナール錠 リマプロストアルファデクス錠	24時間前	1日前（※1）
ω-3脂肪酸エチル （主成分：EPA、DHA）	 ロトリガ粒状カプセル2g		オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル	7日前	
イコサペント酸エチル （EPA）		 エパデールS900	イコサペント酸エチルカプセル エパデール 等	7日前	7～10日前（※1） 5～10日前（※2）
トラピジル		 ロコルナール錠100mg	トラピジル錠 ロコルナール錠50mg	2～3日前	
オザグレル塩酸塩		 ドメナン錠200mg	ドメナン錠100mg オザグレル錠	24～48時間前	

参考資料：
※1　今日の治療薬
※2　抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドライン（2017）
※3　手術医療の実践ガイドライン（2019）
※4　JCS ガイドライン フォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法（2020）
※5　不整脈薬物治療ガイドライン（2020）
※6　非心臓手術における合併心疾患の評価と管理に関するガイドライン（2022年改訂版）
※7　脳卒中ガイドライン（2021（改訂2023））（出血リスクのある処置・手術時の休薬に関する記載は無し）
※8　Addendum of Newer Anticoagulants to the SIR Consensus Guideline

〈患者様へ〉

医薬品の他にサプリメントや健康食品、市販薬を常用されている方は申し出てください。イコサペント酸エチル（EPA）やω-3脂肪酸エチルは、サプリメントや健康食品に含有されている場合がありますので、手術や出血を伴う可能性のある処置・検査を受けられる患者さんは、全てのサプリメント・健康食品・市販薬を7日前から原則中止していただきます。

令和6年1月現在
大阪赤十字病院　　薬剤部
医療安全推進室

消化器内視鏡検査・治療における内服抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間の目安
【院内採用薬・院外登録薬（内服）】

〔職員参照用〕

令和6年1月現在

分類		一般名	当院採用薬（院内・院外）	製剤写真	通常　内視鏡	内視鏡的生検（EUS-FNA除く）		出血低危険度	出血高危険度	
						1剤	2剤以上併用		1剤	2剤以上併用
抗血小板薬	低用量アスピリン	アスピリン	バイアスピリン錠100mg		休薬なし	休薬なし	症例に応じて慎重に対応	休薬なし	休薬なし（血栓・塞栓発症低リスクでは3～5日前休薬）	抗血栓薬の休薬が可能となるまで内視鏡治療の延期が好ましい（施行する場合はガイドライン本文を参照のこと）
		アスピリン・ダイアルミネート	バファリン配合錠A81 ※採用なし							
		アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ配合錠							
		アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	キャブピリン配合錠 ※緊急PCI限定採用							
	チエノピリジン誘導体	チクロピジン	パナルジン錠100mg		休薬なし	休薬なし			5～7日前（血栓・塞栓発症リスクが高い場合はアスピリン or シロスタゾールへ置換）	
		プラスグレル塩酸塩	エフィエント錠2.5mg							
			エフィエント錠3.75mg							
			エフィエントOD錠20mg							
		クロピトグレル硫酸塩	クロピドグレル錠75mg「トーワ」							
			プラビックス錠75mg							
			プラビックス錠25mg							
		クロピトグレル硫酸塩/アスピリン	コンプラビン配合錠			2剤とみなす			2剤とみなす	
	シクロペンチルトリアゾロピリミジン群	チカグレロル	ブリリンタ錠　60mg ※採用なし		休薬なし	休薬なし（血栓・塞栓発症低リスクでは5日前休薬）			5日前（血栓・塞栓発症リスクが高い場合はアスピリン or シロスタゾールへ置換）	
			ブリリンタ錠　90mg ※採用なし							
	その他	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」		休薬なし	休薬なし	症例に応じて慎重に対応	休薬なし	1日	抗血栓薬の休薬が可能となるまで内視鏡治療の延期が好ましい（施行する場合はガイドライン本文を参照のこと）
			プレタールOD錠50mg							
			プレタールOD錠100mg							
		イコサペント酸エチル（EPA）	エパデールS900							
		ω-3脂肪酸エチル	ロトリガ粒状カプセル2g							
		サルポグレラート塩酸塩	アンプラーグ錠100mg							
		ベラプロストナトリウム	プロサイリン錠20							
			ベラサスLA錠60μg							
		リマプロストアルファデクス	オパルモン錠5μg							
			リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」							
		ジピリダモール	ペルサンチン錠25mg							
			ペルサンチンLカプセル							
抗凝固薬		ワルファリン	ワーファリン錠0.5mg		休薬なし	休薬なし（PTINR<3.0を確認）	症例に応じて慎重に対応	休薬なし（PTINR<3.0を確認）	継続（PTINR<3.0を確認）	抗血栓薬の休薬が可能となるまで内視鏡治療の延期が好ましい（施行する場合はガイドライン本文を参照のこと）
			ワーファリン錠1mg							
		ダビガトラン　エテキシラート	プラザキサカプセル75mg			休薬なし		休薬なし	処置当日朝～休薬	
			プラザキサカプセル110mg							
		リバーロキサバン	イグザレルトOD錠10mg							
			イグザレルトOD錠15mg							
		アピキサバン	エリキュース錠2.5mg							
			エリキュース錠5mg							
		エドキサバン	リクシアナOD錠15mg							
			リクシアナOD錠30mg							
			リクシアナOD錠60mg							

参考資料：抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン、添付文書、インタビューフォーム、適正使用ガイド

【注意】抗血小板薬、抗凝固薬の休薬の可否については事前に処方医と相談し検討すること。

大阪赤十字病院　消化器内科
薬剤部
医療安全推進室

術前・術後・産後・長時間安静状態時に休薬考慮する必要のあるホルモン製剤

各種ガイドライン等の基準がある場合は、医師の判断によるものとします。

令和6年1月現在

★休薬考慮期間：手術前4週以内、術後2週以内、産後4週以内、長時間安静状態

商品名	主な薬効
アンジュ21	避妊
アンジュ28	避妊
ジェミーナ配合錠	月経困難症
シンフェーズT28	避妊
トリキュラー21	避妊
トリキュラー28	避妊
ドロエチ配合錠	月経困難症
ファボワール錠21	避妊
ファボワール錠28	避妊

商品名	主な薬効
フリウェル配合錠LD	月経困難症
フリウェル配合錠ULD	月経困難症
マーベロン21	避妊
マーベロン28	避妊
ヤーズ配合錠	月経困難症
ヤーズフレックス配合錠	月経困難症 子宮内膜症に 伴う疼痛改善
ラベルフィーユ21錠	避妊
ラベルフィーユ28錠	避妊
ルナベル配合錠LD	月経困難症
ルナベル配合錠ULD	月経困難症

★休薬考慮期間：手術前4週以内、長期臥床状態

商品名	主な薬効
ウェールナラ配合錠	骨粗鬆症
エストラーナテープ0.09mg	更年期障害 卵巣欠落症状 性腺機能低下症
エストラーナテープ0.18mg	更年期障害 卵巣欠落症状 性腺機能低下症
エストラーナテープ0.36mg	更年期障害 卵巣欠落症状 性腺機能低下症
エストラーナテープ0.72mg	更年期障害 卵巣欠落症状 性腺機能低下症
エストリオール錠1mg	更年期障害 骨粗鬆症
エストリール錠100γ	更年期障害
エストリール錠0.5mg	更年期障害 骨粗鬆症
エストリール錠1mg	更年期障害 骨粗鬆症
エストラジオール錠0.5mg	更年期障害 卵巣欠落症状 骨粗鬆症

商品名	主な薬効
エフメノカプセル100mg	更年期障害 卵巣欠落症状
ジュリナ錠0.5mg	更年期障害 卵巣欠落症状
ダイホルモン・デポー注	更年期障害 卵巣欠落症状 骨粗鬆症
ディビゲル1mg	更年期障害 卵巣欠落症状
プラノバール配合錠	月経異常 子宮内膜症 卵巣機能不全
プリモジアン・デポー筋注	更年期障害 卵巣欠落症状 骨粗鬆症
プレマリン錠0.625mg	更年期障害 卵巣機能不全 子宮出血
プロギノン・デポー筋注10mg	更年期障害 卵巣機能不全 子宮出血
ホーリン錠1mg	更年期障害 骨粗鬆症
メノエイドコンビパッチ	更年期障害 卵巣欠落症状
ル・エストロジェル0.06%	更年期障害 卵巣欠落症状

★休薬考慮期間：手術後1週以内

商品名	主な薬効
ヒスロンH錠200mg	乳癌 子宮体癌

商品名	主な薬効
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	乳癌 子宮体癌

★休薬考慮期間：長期不動状態（術後回復期、長期安静期等）に入る3日前

商品名	主な薬効
エビスタ錠60mg	骨粗鬆症
ビビアント錠20mg	骨粗鬆症

商品名	主な薬効
バゼドキシフェン錠20mg	骨粗鬆症
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	骨粗鬆症

薬剤部　医療安全推進室